



Mất Thính Lực Hỗn Hợp

Nguồn Tham Khảo:



[Về Thính Giác](#)



[Các Dạng Mất Thính Lực](#)

(liên kết chỉ bằng tiếng Anh)



[Thông Tin Thêm Về Các Dạng Mất Thính Lực](#)




[Mất Thính Lực Kích Thích](#)

(liên kết chỉ bằng tiếng Anh)

Mất Thính Lực Hỗn Hợp xảy ra khi mất thính lực thần kinh giác quan và mất thính lực dẫn truyền xảy ra cùng một lúc.

- **Mất Thính Lực Thần Kinh Giác Quan (SNHL):** Mất thính lực “cảm giác” là khi có sự bất thường ở các tế bào lông nhỏ hoặc các cấu trúc ở tai trong. Mất thính lực “thần kinh” là khi dây thần kinh thính giác bị suy giảm. SNHL được chẩn đoán khi không rõ vấn đề nằm ở đâu trong tai trong. SNHL có thể được gây ra bởi một số nguyên nhân: bệnh tật, di truyền, thuốc men, là một phần của hội chứng và nguyên nhân chưa rõ.
- **Mất Thính Giác Dẫn Truyền:** Loại mất thính lực này xảy ra khi âm thanh không thể di chuyển qua tai giữa hoặc tai ngoài do có sự bất thường. Nguyên nhân phổ biến là ráy tai làm tắc ống tai, dịch tích tụ ở tai giữa, nhiễm trùng, chấn thương hoặc bất thường về xương.
- **Mất Thính Lực Hỗn Hợp:**
 - Điều trị đôi khi có thể giải quyết được phần dẫn truyền của chứng mất thính lực (thuốc hoặc phẫu thuật), nhưng thường không thể giải quyết được phần thần kinh cảm giác của chứng mất thính lực.
 - Những bất thường ở tai ngoài và/hoặc tai giữa có thể gây ra sự thay đổi tạm thời hoặc vĩnh viễn về thính lực. Mọi tình trạng mất thính lực đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng học tập, lắng nghe và nói của trẻ sơ sinh; do đó, cần phải tìm hiểu và bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt.
 - Các lựa chọn điều trị bao gồm Hệ thống thính giác neo vào xương (BAHA), máy trợ thính và/hoặc cấy ghép ốc tai điện tử.
 - Đối với trẻ bị bất kỳ loại mất thính lực nào, quý vị nên đưa trẻ đi khám bác sĩ thính học nhi khoa, đây là chuyên gia chỉ làm việc chữa trị với trẻ sơ sinh và trẻ em.



12.2023 Mixed Hearing Loss Vietnamese