



Pérdida Auditiva Unilateral

Recursos:



[Apoyando el éxito en UHL](#)



[Consejos para padres](#)



[Resultados de la investigación](#)

- La pérdida auditiva unilateral (UNHL, por sus siglas en inglés) significa que el niño tiene pérdida auditiva en un solo oído.
- Actualmente, la prevalencia u ocurrencia de UNHL al nacer es de aproximadamente 1 por 1000 bebés. Este número sube de 3 a 6 niños por cada 1000 en edad escolar, porque la detección al nacer muchas de las veces no detecta una pérdida mínima o leve (no está diseñada para ello) o porque la pérdida auditiva progresa con el tiempo.
- 31-50% de los casos de UNHL tienen una causa desconocida. Sin embargo, otras causas pueden ser malformaciones del oído o infecciones como el citomegalovirus (sy·toe·MEG·a·low·vy·rus), o CMV.
- La UNHL puede variar desde una pérdida auditiva leve hasta una pérdida auditiva profunda (también llamada sordera de un solo lado o SSD).
- La audición puede deteriorarse con el tiempo dependiendo de la causa de la pérdida. Alrededor del 7-11% de los UNHL progresarán hacia la pérdida auditiva en ambos oídos.
- Los niños con pérdida unilateral tendrán dificultades para localizar o saber de dónde proviene el sonido, lo que puede afectar su seguridad y descubrir quién está hablando en un grupo.
- Los niños con UNHL también tendrán grandes dificultades para comprender el habla en presencia de ruido de fondo.
- Los niños con UNHL podrían sentir fatiga auditiva, lo que podría afectar su capacidad para concentrarse y aprender durante el día.
- En el pasado, se pensaba que los niños con UNHL tenían un “buen” oído para que les fuera bien. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que este no es el caso y que las intervenciones, o al menos el seguimiento, son beneficiosas.
- Según el tipo y la causa de la pérdida auditiva, los niños con UNHL pueden beneficiarse de la colocación de un audífono, una colocación de un Baha o un implante coclear.
- Cuando el niño llegue a la edad escolar, también se beneficiará del uso de la tecnología de micrófono remoto para ayudar en habitaciones más grandes y ruidosas.
- Todos los bebés con UNHL deben inscribirse en intervención temprana y recibir terapia para ayudar a reducir los impactos negativos de la pérdida auditiva.